

Screeningsark til Livet med sorgen: Hvor godt virker individuel versus gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi mod komplicerede sorgreaktioner hos ældre efterladte og gennem hvilke forandringsmekanismer virker terapien?


På bagsiden er et screeningsdiagram, som følges ved udfyldelse af screeningsarket.

Sæt kryds når du vurderer at kriteriet er opfyldt.

<u>Inklusionskriterier</u>	
	Er 65 år gammel eller derover
	Har mistet en ægtefælle eller partner
	Dødsfaldet af nærtstående person fandt sted for mere end 6 måneder siden
Udviser tegn på en eller flere af følgende komplicerede sorgreaktioner:	
	1. Forlænget sorglidelse (f.eks. længes voldsomt efter afdøde, gennemgribende optaget af den afdøde og dødsfaldet)
	2. Depression (f.eks. konstant trist, ked af det, socialt tilbagetrukket, nedtrykt og opgivende.)
	3. Angst (f.eks. virkelig bange, ekstreme bekymringer og nervøsitet)
	4. Posttraumatisk stress (f.eks. ufrivillig genoplevelse af tabet, undgåelse af tabsrelateret situationer, ting m.m.)

<u>Eksklusionskriterier</u>	
	Har ikke tilstrækkelige danskundskaber til at kunne profitere af behandlingen
	Er ikke i stand til at transportere sig selv til klinikken i København K
	Har svær psykopatologi (f.eks. skizofreni, psykose, personlighedsforstyrret) som kan hindre at vedkommende profiterer af behandlingen
	For dårligt kognitivt fungerende til at kunne profitere af behandlingen (f.eks. Alzheimers demens)
	Lider primært af misbrugsrelaterede problematikker
	Akut selvmordstruet

Screeningsdiagram



Ved tvivl om en specifik borger opfylder nogle af inklusions/eksklusionskriterierne, er du meget velkommen til at ringe på + 45 40 56 67 66 og lægge dit telefonnummer. Så vil du blive ringet op og kan modtage anonym rådgivning inden vi evt. modtager henvisningen.